

行政院衛生署屏東醫院

AGGRASTAT

Unstable Angina and NSTEMI

病人體重 (公斤)	大多數病人		嚴重腎功能不全病人	
	前 30 分鐘	維持輸注速率	前 30 分鐘	維持輸注速率
	Loading Rate	Maintain Rate	Loading Rate	Maintain Rate
30 ~ 37	16	4	8	2
38 ~ 45	20	5	10	3
46 ~ 54	24	6	12	3
55 ~ 62	28	7	14	4
63 ~ 70	32	8	16	4
71 ~ 79	36	9	18	5
80 ~ 87	40	10	20	5
88 ~ 95	44	11	22	6
96 ~ 104	48	12	24	6
105 ~ 112	52	13	26	7
113 ~ 120	56	14	28	7
121 ~ 128	60	15	30	8
129 ~ 137	64	16	32	8
138 ~ 145	68	17	34	9
146 ~ 153	72	18	36	9

1. AGGRASTAT 須採靜脈注射，並與 HEPARIN 併用，起始輸注速率為 **0.4ug/kg/min**，輸注 30 分鐘。起始輸注後，應再繼續以 **0.1ug/kg/min** 之維持輸注速率持續輸注。上表為根據體重所做之劑量調整方法指引。
2. 在證明臨床有療效的研究中，AGGRASTAT 併用 HEPARIN 持續輸注至少 48 小時，至多 108 小時，病人平均接受 AGGRASTAT 輸注 71.3 小時。
3. 執行冠狀動脈放射檢查期間可持續輸注本藥，而且必須持續至冠狀動脈成形術/冠狀動脈粥狀硬化切除完成後之 12 至 24 小時。
4. 當病人的活化性凝血時間 (activated clotting time) 少於 180 秒或停止注射 HEPARIN 後 2~6 小時，動脈鞘(arterial sheath)需取出。