

全民健康保險藥物給付項目及支付標準－第六編第八十三條

「藥品給付規定」修正規定

第 2 節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自 102 年 8 月 1 日生效)

修正後給付規定	原給付規定																																																																													
<p>2.6. 降血脂藥物 Drugs used for dyslipidemia</p> <p>2.6.1.全民健康保險降血脂藥物給付規定表（86/1/1、87/4/1、87/7/1、91/9/1、93/9/1、97/7/1、102/8/1）</p> <p style="text-align: center;">全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表</p> <table border="1" data-bbox="142 724 1172 1081"> <thead> <tr> <th>非藥物治療</th> <th>起始藥物治療血脂值</th> <th>血脂目標值</th> <th>處方規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>與藥物治療可並行</td> <td>TC\geq160mg/dL 或 LDL-C\geq100mg/dL</td> <td>TC<160mg/dL 或 LDL-C<100mg/dL</td> <td>第一年應每 3-6 個月抽血檢查一次，</td> </tr> <tr> <td>2 個危險因子或以上</td> <td>TC\geq200mg/dL 或 LDL-C\geq130mg/dL</td> <td>TC<200mg/dL 或 LDL-C<130mg/dL</td> <td>第二年以後應至少每 6-12 個月抽血檢查一次，同時請注意副作用之產生如</td> </tr> <tr> <td>1 個危險因子</td> <td>TC\geq240mg/dL 或 LDL-C\geq160mg/dL</td> <td>TC<240mg/dL 或 LDL-C<160mg/dL</td> <td>肝功能異常，橫紋肌溶解症。</td> </tr> <tr> <td>0 個危險因子</td> <td>LDL-C\geq190mg/dL</td> <td>LDL-C<190mg/dL</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● 心血管疾病定義： <ul style="list-style-type: none"> (一) 冠狀動脈粥狀硬化病人：心絞痛病人，有心導管證實或缺氧性心電圖變化或負荷性試驗陽性反應者(附檢查報告) (二) 缺血型腦血管疾病病人包含： <ul style="list-style-type: none"> 1. 腦梗塞。 2. 暫時性腦缺血患者(TIA)。(診斷須由神經科醫師確立) 3. 有症狀之頸動脈狹窄。(診斷須由神經科醫師確立) ● 危險因子定義： <ul style="list-style-type: none"> 1. 高血壓 2. 男性\geq45 歲，女性\geq55 歲或停經者 3. 有早發性冠心病家族史(男性\leq55 歲，女性\leq65 歲) 4. HDL-C<40mg/dL 5. 吸菸(因吸菸而符合起步治療準則之個案，若未戒菸而要求藥物治療，應以自費治療)。 <p style="text-align: center;">全民健康保險降三酸甘油酯藥物給付規定表</p> <table border="1" data-bbox="142 1564 1172 1921"> <thead> <tr> <th>非藥物治療</th> <th>起始藥物治療三酸甘油酯值</th> <th>三酸甘油酯目標值</th> <th>處方規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>與藥物治療可並行</td> <td>TG\geq200mg/dL 且 (TC/HDL-C>5 或 HDL-C<40mg/dL)</td> <td>TG<200mg/dL</td> <td>第一年應每 3-6 個月抽血檢查一次，第二年以後應至少每 6-12 個月抽</td> </tr> <tr> <td>給藥前應有 3-6 個月非藥物治療</td> <td>TG\geq200mg/dL 且 (TC/HDL-C>5 或 HDL-C<40mg/dL)</td> <td>TG<200mg/dL</td> <td>血檢查一次，同時請注意副作用之產生如肝功</td> </tr> <tr> <td>與藥物治療可並行</td> <td>TG\geq500mg/dL</td> <td>TG<500mg/dL</td> <td>能異常，橫紋肌溶解症。</td> </tr> </tbody> </table>	非藥物治療	起始藥物治療血脂值	血脂目標值	處方規定	與藥物治療可並行	TC \geq 160mg/dL 或 LDL-C \geq 100mg/dL	TC<160mg/dL 或 LDL-C<100mg/dL	第一年應每 3-6 個月抽血檢查一次，	2 個危險因子或以上	TC \geq 200mg/dL 或 LDL-C \geq 130mg/dL	TC<200mg/dL 或 LDL-C<130mg/dL	第二年以後應至少每 6-12 個月抽血檢查一次，同時請注意副作用之產生如	1 個危險因子	TC \geq 240mg/dL 或 LDL-C \geq 160mg/dL	TC<240mg/dL 或 LDL-C<160mg/dL	肝功能異常，橫紋肌溶解症。	0 個危險因子	LDL-C \geq 190mg/dL	LDL-C<190mg/dL		非藥物治療	起始藥物治療三酸甘油酯值	三酸甘油酯目標值	處方規定	與藥物治療可並行	TG \geq 200mg/dL 且 (TC/HDL-C>5 或 HDL-C<40mg/dL)	TG<200mg/dL	第一年應每 3-6 個月抽血檢查一次，第二年以後應至少每 6-12 個月抽	給藥前應有 3-6 個月非藥物治療	TG \geq 200mg/dL 且 (TC/HDL-C>5 或 HDL-C<40mg/dL)	TG<200mg/dL	血檢查一次，同時請注意副作用之產生如肝功	與藥物治療可並行	TG \geq 500mg/dL	TG<500mg/dL	能異常，橫紋肌溶解症。	<p>2.6. 降血脂藥物 Drugs used for dyslipidemia</p> <p>2.6.1.全民健康保險降血脂藥物給付規定表（86/1/1、87/4/1、87/7/1、91/9/1、93/9/1、97/7/1）</p> <table border="1" data-bbox="1231 640 2834 1260"> <thead> <tr> <th>準治起 則療步 之 異常 血脂</th> <th>血脂濃度</th> <th>\geq2 個危險因子 (如附註二)</th> <th>TC/HDL-C > 5 或 HDL-C < 40mg/dL</th> <th>治療目標</th> <th>處方規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">無 心 血 管 疾 病 患 者 (如附註一)</td> <td rowspan="2">TC</td> <td>\geq200mg/dL</td> <td>×</td> <td>< 200mg/dL</td> <td rowspan="4">如非藥物治療未達治療目標，得使用降血脂藥物(請附三個月前及本次血脂檢查數據)，接受藥物治療後，應每三至六個月抽血檢查一次，同時請注意副作用產生，如肝功能異常或橫紋肌溶解症等，如已達治療目標得考慮減量至最低有效劑量，並持續衛教治療。(91/9/1、93/9/1、97/7/1)</td> </tr> <tr> <td>\geq240mg/dL</td> <td>×</td> <td>< 240mg/dL</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">LDL-C</td> <td>\geq130mg/dL</td> <td>×</td> <td>< 130mg/dL</td> </tr> <tr> <td>\geq160mg/dL</td> <td>×</td> <td>< 160mg/dL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">有 心 血 管 疾 病 患 者 或 糖 尿 病 患 者</td> <td rowspan="3">TG \geq200mg/dL (需同時合併有 TC/HDL-C>5 或是 HDL-C<40mg/dL)(91/9/1)</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>< 200mg/dL (87/4/1)</td> </tr> <tr> <td>×</td> <td>×</td> <td>< 160mg/dL (87/7/1)</td> </tr> <tr> <td>×</td> <td>×</td> <td>\leq100mg/dL (87/7/1)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">有 心 血 管 疾 病 患 者 或 糖 尿 病 患 者</td> <td rowspan="2">TG \geq200mg/dL (需同時合併有 TC/HDL-C>5 或是 HDL-C<40mg/dL) (91/9/1)</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>< 150mg/dL (87/7/1)</td> </tr> <tr> <td>×</td> <td>×</td> <td>< 150mg/dL (87/7/1)</td> </tr> </tbody> </table> <p>血中三酸甘油酯高於 500mg/dL，具有罹患急性胰臟炎危險者，得使用降血脂藥物。(87/4/1、93/9/1)</p> <p>附註一：心血管疾病： (一)冠狀動脈粥狀硬化患者 有心導管檢查證實(附檢查報告、醫院名稱及日期)。 曾患心肌梗塞有心電圖(附心電圖)或住院證實(附檢查醫院名稱及日期)。 心絞痛病患，有缺氧性心電圖變化或運動試驗陽性反應者(附檢查報告)。 (二)腦血管病變患者 腦梗塞。 腦內出血(不含其他顱內出血)。 陣發性腦缺血患者(TIA)其頸動脈超音波證實有粥腫樣變化併有 70%以上阻塞者。 (三)周邊血管粥狀硬化有缺血性症狀且經血管都卜勒超音波或血管攝影證實者。 附註二：危險因子： 1.高血壓 2.糖尿病 3.男性\geq45 歲 4.有早發性冠心病家族史 5.女性\geq55 歲或停經沒有雌激素療法者 6.吸菸(因吸菸而符合起步治療準則之個案，如要求藥物治療，應以自費治療)。</p>	準治起 則療步 之 異常 血脂	血脂濃度	\geq 2 個危險因子 (如附註二)	TC/HDL-C > 5 或 HDL-C < 40mg/dL	治療目標	處方規定	無 心 血 管 疾 病 患 者 (如附註一)	TC	\geq 200mg/dL	×	< 200mg/dL	如非藥物治療未達治療目標，得使用降血脂藥物(請附三個月前及本次血脂檢查數據)，接受藥物治療後，應每三至六個月抽血檢查一次，同時請注意副作用產生，如肝功能異常或橫紋肌溶解症等，如已達治療目標得考慮減量至最低有效劑量，並持續衛教治療。(91/9/1、93/9/1、97/7/1)	\geq 240mg/dL	×	< 240mg/dL	LDL-C	\geq 130mg/dL	×	< 130mg/dL	\geq 160mg/dL	×	< 160mg/dL	有 心 血 管 疾 病 患 者 或 糖 尿 病 患 者	TG \geq 200mg/dL (需同時合併有 TC/HDL-C>5 或是 HDL-C<40mg/dL)(91/9/1)	×	×	< 200mg/dL (87/4/1)	×	×	< 160mg/dL (87/7/1)	×	×	\leq 100mg/dL (87/7/1)	有 心 血 管 疾 病 患 者 或 糖 尿 病 患 者	TG \geq 200mg/dL (需同時合併有 TC/HDL-C>5 或是 HDL-C<40mg/dL) (91/9/1)	×	×	< 150mg/dL (87/7/1)	×	×	< 150mg/dL (87/7/1)
非藥物治療	起始藥物治療血脂值	血脂目標值	處方規定																																																																											
與藥物治療可並行	TC \geq 160mg/dL 或 LDL-C \geq 100mg/dL	TC<160mg/dL 或 LDL-C<100mg/dL	第一年應每 3-6 個月抽血檢查一次，																																																																											
2 個危險因子或以上	TC \geq 200mg/dL 或 LDL-C \geq 130mg/dL	TC<200mg/dL 或 LDL-C<130mg/dL	第二年以後應至少每 6-12 個月抽血檢查一次，同時請注意副作用之產生如																																																																											
1 個危險因子	TC \geq 240mg/dL 或 LDL-C \geq 160mg/dL	TC<240mg/dL 或 LDL-C<160mg/dL	肝功能異常，橫紋肌溶解症。																																																																											
0 個危險因子	LDL-C \geq 190mg/dL	LDL-C<190mg/dL																																																																												
非藥物治療	起始藥物治療三酸甘油酯值	三酸甘油酯目標值	處方規定																																																																											
與藥物治療可並行	TG \geq 200mg/dL 且 (TC/HDL-C>5 或 HDL-C<40mg/dL)	TG<200mg/dL	第一年應每 3-6 個月抽血檢查一次，第二年以後應至少每 6-12 個月抽																																																																											
給藥前應有 3-6 個月非藥物治療	TG \geq 200mg/dL 且 (TC/HDL-C>5 或 HDL-C<40mg/dL)	TG<200mg/dL	血檢查一次，同時請注意副作用之產生如肝功																																																																											
與藥物治療可並行	TG \geq 500mg/dL	TG<500mg/dL	能異常，橫紋肌溶解症。																																																																											
準治起 則療步 之 異常 血脂	血脂濃度	\geq 2 個危險因子 (如附註二)	TC/HDL-C > 5 或 HDL-C < 40mg/dL	治療目標	處方規定																																																																									
無 心 血 管 疾 病 患 者 (如附註一)	TC	\geq 200mg/dL	×	< 200mg/dL	如非藥物治療未達治療目標，得使用降血脂藥物(請附三個月前及本次血脂檢查數據)，接受藥物治療後，應每三至六個月抽血檢查一次，同時請注意副作用產生，如肝功能異常或橫紋肌溶解症等，如已達治療目標得考慮減量至最低有效劑量，並持續衛教治療。(91/9/1、93/9/1、97/7/1)																																																																									
		\geq 240mg/dL	×	< 240mg/dL																																																																										
	LDL-C	\geq 130mg/dL	×	< 130mg/dL																																																																										
		\geq 160mg/dL	×	< 160mg/dL																																																																										
有 心 血 管 疾 病 患 者 或 糖 尿 病 患 者	TG \geq 200mg/dL (需同時合併有 TC/HDL-C>5 或是 HDL-C<40mg/dL)(91/9/1)	×	×	< 200mg/dL (87/4/1)																																																																										
		×	×	< 160mg/dL (87/7/1)																																																																										
		×	×	\leq 100mg/dL (87/7/1)																																																																										
有 心 血 管 疾 病 患 者 或 糖 尿 病 患 者	TG \geq 200mg/dL (需同時合併有 TC/HDL-C>5 或是 HDL-C<40mg/dL) (91/9/1)	×	×	< 150mg/dL (87/7/1)																																																																										
		×	×	< 150mg/dL (87/7/1)																																																																										